



CORONA-IMPfstOFFE IM ÜBERBLICK

	Haltbarkeit aufgetaut (ungeöffnet!)	Haltbarkeit nach anbrechen / aufziehen	Dosen pro Durchstechflasche	Benötigte Impfdosen	Empfohlener Abstand	Zulassung	Abrechnung*	
							Erstimpfung	Zweitimpfung
Biontech/Pfizer (Comirnaty®)	5 Tage bei 2-8°C, 2 Stunden bei Raumtemperatur bis 30°C	6 Stunden bei 2-30°C	6 x 0,3ml (7 x 0,3ml als ungesicherter Erfahrungswert)	2	6 Wochen	ab 16 Jahre	88331A	88331B
Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna)	30 Tage bei 2-8°, 12 Stunden bei 8-25°C	6 Stunden bei 8-25°C	10 x 0,5ml	2	6 Wochen	ab 18 Jahre	88332A	88332B
Astrazeneca (Vaxzevria®)	6 Monate bei 2-8°C	48 Stunden bei 2-8°C, in der Injektionsspritze 6 Stunden bis zu 30°C (danach nicht wieder in den Kühlschrank!)	8 oder 10 x 0,5ml	2	12 Wochen; bei <60 Zweitimpfung i.d.R. mit Biontech/Pfizer oder Moderna	ab 18 Jahre, laut STIKO-Empfehlung jedoch regelhaft nur ab 60 Jahren einzusetzen!	88333A	88333B
Johnson&Johnson (Jansen Ad26.COV2.S)	3 Monate bei 2-8°C, 12 Stunden bei 9-25°C	6 Stunden bei 2-8°C, 2 Stunden bei Raumtemperatur	5 x 0,5ml	1	-	ab 18 Jahre	88334A	88334B

*Regionale KVen können von den Abrechnungsziffern abweichen.